



Dispensación  
**Segura**



**Somos**  
**Farmacia**

**Boletín FCV N°52/2024**  
Edición Especial Veterinaria N°1

## **ANEXO Fichas Técnicas de Antiparasitarios Externos.**

### **¿Qué antiparasitario es el indicado?**

Para resolver esta consulta a continuación te proporcionamos la información del espectro parasitario de los nuevos productos disponibles en Cruz Verde junto a su modo de uso y ventajas.

### **Presentaciones de antiparasitarios externos e internos**

#### **Externo**

Pulgas, garrapatas, ácaros y piojos

#### Presentación:


- Collar
- Pipetas
- Spray
- Shampoo
- Comprimidos

#### **Interno**

Lombrices, tenias, anquilostomas, gardia, coccidios.

#### Presentación:

- Comprimidos
- Solución oral
- Inyección



## Introducción

Los antiparasitarios externos e internos pueden ser encontrados en distintas presentaciones y se debe dar prioridad a la comodidad del tutor y de la mascota, a la frecuencia de administración y al espectro parasitario de cada uno.



En el caso de antiparasitarios externos en presentaciones de sprays y collares teniendo en consideración algunas restricciones, es posible combinarlos con el uso de pipetas, spot on y comprimidos en el combate contra ectoparásitos.

Entonces para recomendar un antiparasitario debemos tener en cuenta:

1. **La especie:** Si es perro o gato; algunos activos no son intercambiables entre especies, la incorrecta utilización puede provocar algún cuadro de intoxicación.
2. **La edad:** Cuando se trata de cachorros, por lo general los antiparasitarios tienen una edad mínima para comenzar su uso.
3. **El peso:** Los antiparasitarios según su presentación tienen un rango de peso en el cuál terapéuticamente es efectivo y seguro; por lo tanto, se debe tener en consideración el peso de la mascota para escoger uno que sea útil en su rango de peso o hacer los ajustes necesarios (ej. Si un perro pesa 20kg y se le quiere administrar un antiparasitario que por comprimido es útil hasta 10kg, se deben administrar 2 comprimidos).
4. **Enfermedades y otros medicamentos:** Se debe tener consideración si existe alguna patología base en la mascota, por ejemplo, renal o hepática, o si se utiliza con regularidad algún medicamento, ya que los antiparasitarios no están exentos de generar interacciones medicamentosas.
5. **Hembras:** Se debe tener en cuenta si una hembra está preñada o lactando para sugerir un antiparasitario seguro.

Para facilitar estas consideraciones, puedes considerar el acrónimo **EPEC**

<b>E</b>	<b>P</b>	<b>E</b>	<b>C</b>
<b>Especie</b>	<b>Peso</b>	<b>Edad</b>	<b>Condición</b>
- Perro. - Gato.	- En Kg	- Cachorro. - Adulto.	- Gestación. - Lactancia. - Enfermedades.



# Antiparasitarios externos

## • Collares antiparasitarios

Venta Directa /Especies: 

### Seresto® Collar



- **Composición:** Flumetrina/Imidacloprida
- **Indicaciones:** tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis) por 7 a 8 meses. Para el tratamiento y prevención de dermatitis por alergia a pulgas. El producto tiene una eficacia garrapaticida persistente y acción repelente contra infestaciones por garrapatas por 8 meses. Es efectivo contra garrapatas en forma de larva, ninfa y adulta. En perros se puede utilizar a partir de 7 semanas y para gatos a partir de las 10 semanas de vida.
- **Contraindicaciones:** No administrar a gatitos menores de 10 semanas de edad. No administrar a cachorros menores de 7 semanas de edad. No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
- **Efectos adversos:** Una leve caída del pelo o reacciones leves en la piel. Prurito, eritema y pérdida de pelo pueden ocurrir en el sitio de aplicación, lo cual usualmente se recupera dentro de una o dos semanas sin necesidad de sacar el collar.

#### Presentaciones y SKU:

- Collar para gatos y perros de hasta 8 kg (largo collar: 38 cm)
- Collar para perros de más de 8 kg de peso (largo collar: 70 cm)

#### Condición de venta: Venta directa

SKU	DESCRITOR
532150	SEREST.COLL.HAST.8KG.38CM
532149	SEREST.COLL.PERR+8KG.70CM

#### Consideraciones extras:

- En gatos protege contra el desarrollo de larvas de pulgas por 10 semanas y en perros por 8 meses.
- Si el perro presenta garrapatas previo al tratamiento, puede que no sean eliminadas inmediatamente después de la aplicación del collar y pueden quedar adheridas y visibles. Por lo tanto, se recomienda sacar las garrapatas que tiene el perro al momento de colocar el collar. La prevención de infestaciones con nuevas garrapatas comienza dentro de 2 días después de la aplicación del collar.
- Idealmente el collar debe ser colocado antes del comienzo de la estación de pulgas.

#### Ventajas de Seresto®

- Sin olor y no tóxico. Exposición Dérmica segura para personas y mascotas. Tiene un mecanismo único y patentado de liberación controlada de principios activos.
- Resistente al agua, no es necesario quitárselo antes de nadar o bañarse.
- Posee doble mecanismo de seguridad. En caso de que un gato llegara a quedarse atrapado, la misma fuerza del gato será suficiente para activar un mecanismo de liberación rápida que lo suelta al aplicar una fuerza de más de 50 newtons (la misma fuerza ejercida por un gato de 2 kg al saltar a una altura de 40 cm). Si esto no resultará suficiente para liberar al animal, el collar tiene un mecanismo adicional, un punto predeterminado de liberación al aplicar 80 newtons que rompe el collar y libera el animal.



## Bayticol® Collar



- **Composición:** 10 g de collar contiene: 1 g de Propoxur, 0,225 g de Flumetrina
- **Indicaciones de Uso:** Para tratamiento y control de garrapatas *Rhipicephalus sanguineus*, y pulgas *Ctenocephalides canis / felis* en perros y para proteger contra la reinfección
- **Efecto garrapaticida:** El collar es efectivo contra las garrapatas y pulgas por hasta 7 meses.
- **Contraindicaciones:** No administrar a cachorros menores de 3 meses. No usar en periodo de gestación, lactancia ni en animales reproductores. Propoxur puede causar contracción de músculos lisos, por lo tanto, no se debe utilizar en mascotas con antecedentes respiratorios, urinarios o de obstrucción digestiva.
- **Efectos adversos:** Puede producir leve caída del pelo o reacciones leves en la piel como prurito, eritema y pérdida de pelo que pueden ocurrir en el sitio de aplicación o de forma generalizada.
- **Sobredosis:** Muy raramente los síntomas como vómitos, diarrea o salivación pueden ocurrir después de la exposición del producto por vía oral.

### Presentaciones y SKU:

- Los perros pequeños deben usar un collar de 35 cm de largo.
- Los perros grandes deben usar un collar de 48 cm de largo.
- Los perros grandes deben usar un collar de 66 cm de largo.

SKU	Descriptor
152142	BAYTICOL PLUS COLLAR 66CM
152141	BAYTICOL PLUS COLLAR 35CM
152132	BAYTICOL PLUS COLLAR 48CM

### Condición de venta: Venta directa.

### Consideraciones extras:

- El collar no es a prueba de agua, se debe retirar cada vez que la mascota se bañe o entre en algún curso de agua.



- **Pipetas**

Venta Directa /Especies: 

### Advantage® Pipeta



- **Composición:** Imidacloprida 100 mg/mL
- **Indicaciones de Uso:** está indicado en el tratamiento y control de infestaciones por pulgas y larvas (*Ctenocefalides spp.*) en gatos. Puede ser usada en Dermatitis alérgica causada por pulgas (DAPP).
- **Duración del tto.:** Una pipeta de Advantage gatos tiene un efecto de 4 semanas. Transcurrido este período debe repetirse el tratamiento, aunque no se observen pulgas. Se puede usar en periodo de gestación y lactancia.
- **Contraindicaciones:** No administrar a gatitos menores de 2 meses.
- **Efectos adversos:** En raros casos puede observarse caída de pelo temporal, picazón o reacción inflamatoria en el sitio de aplicación
- **Sobredosis:** En casos aislados, aumento de la salivación y síntomas nerviosos como incoordinación, tremor y depresión han sido reportados en gatos. El lamido en el sitio de aplicación puede causar salivación transitoria.

#### Presentaciones y SKU:

- Pipeta de 0,4 mL para gatos hasta 4 kg de peso
- Pipeta de 0,8 mL para gatos entre 4 -8 kg de peso (equivalente a 10 mg de imidacloprid por kg de peso).

SKU	Descriptor
152135	ADVANTAGE GATOS < 4KG
536656	ADVANTAGE GATOS 4-8KG


#### Condición de venta: Venta directa

#### Modo de aplicación de la pipeta:

1. Girar la tapa para perforar la pipeta y retirar.
2. Separar el pelo de la parte posterior de la cabeza y aplicar todo el contenido de la pipeta directamente sobre la piel del animal. Según imagen a continuación:



## Advantix® Pipeta



- **Composición:** Imidacloprida 100 mg/mL y Permetrina 500 mg/mL.
- **Indicaciones de Uso:** control y tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) y pulgas (*Ctenocephalides spp.*), actuando también como repelente de zancudos y mosquitos (*Culex spp.*). Puede ser usado en Dermatitis alérgica causada por pulgas (DAPP).
- **Eficacia del tto.:** Las pulgas son eliminadas 1 día después del tratamiento. Un tratamiento previene nuevas infestaciones por 4 semanas de pulgas y garrapatas. Tiene eficacia acaricida. Se puede usar en periodo de gestación, lactancia.
- **Contraindicaciones:** No utilizar en perros menores de 7 semanas de edad ni en perros de menos de 1,5 kg. No utilizar en gatos.
- **Efectos adversos:** En raras ocasiones se puede presentar reacciones en los perros como sensibilidad cutánea (incluyendo prurito y/o eritema en el sitio de aplicación) o letargia que resuelven espontáneamente.

### Presentaciones y SKU:


- Dosis equivalente a un mínimo de 10 mg/kg de peso corporal de Imidacloprida y 50 mg/kg de peso corporal de Permetrina.
- Para perros desde 4 kg a 10 kg de peso: 1 pipeta de 1 mL
- Para perros desde 10 kg a 25 kg de peso: 1 pipeta de 2,5 mL
- Para perros desde 25 kg-40 kg de peso: 1 pipeta de 4,0 mL
- Para perros de > 40 kg debe utilizarse una combinación adecuada de pipetas.

SKU	Descriptor
152367	ADVANTIX PERRO 4-10K 1ML
152368	ADVANTIX PERRO 10-25K.2,5
152369	ADVANTIX PERRO 25-40K 4ML

### Condición de venta: Venta directa

### Modo de aplicación de la pipeta:

1. Girar la tapa para perforar la pipeta y retirar.
  2. Separar el pelo de la parte posterior de la cabeza y aplicar todo el contenido de la pipeta directamente sobre la piel del animal de uno (<10kg) a 4 puntos (>10kg). No aplicar una cantidad excesiva de la solución en un mismo punto ya que podría deslizarse por el costado del perro.
- Aplicar según imagen a continuación:



## Fiprodrag® Pipeta



- **Composición:** Fipronil 100 mg/mL. Dosis: 6,7 - 13,4 mg de Fipronil/Kg de peso.
- **Indicaciones de Uso:** Está indicado para el tratamiento y control de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*), piojos (*Trichodectes canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*). En gatos de hasta 9,1 Kg se debe aplicar una pipeta de 0,5 mL. Se puede utilizar en dermatitis alérgica a la picada de pulga (DAPP)
- **Eficacia del tto.:** permite controlar la reinfección por un período de al menos 8 semanas contra pulgas y de al menos 5 semanas contra garrapatas en perros. Y en gatos hasta 5 semanas contra pulgas. Puede ser aplicado en hembras preñadas o en lactancia. Si la infestación es alta se debe utilizar cada 1 mes.
- **Contraindicaciones:** No aplicar a perros menores a 10 semanas de edad y en gatos menores a 12 semanas de edad. No se recomienda bañar a la mascota 48 horas antes y después de aplicado el producto. No usar en conejos.
- **Efectos adversos:** Si el animal se lamiese puede existir un breve período de hipersalivación. Podrían ocurrir reacciones cutáneas transitorias en el sitio de aplicación, como eritema, prurito o alopecia.

### Presentaciones y SKU:

- En perros de hasta 10 Kg de peso, aplicar una pipeta de 0,67 mL.
- En perros de 10 a 20 Kg de peso, aplicar una pipeta de 1,34 mL.
- En perros de 20 a 40 Kg de peso, aplicar una pipeta de 2,68 mL.
- En perros de 40 a 60 Kg de peso, aplicar una pipeta de 4,02 mL.
- En gatos de hasta 9,1 Kg de peso, aplicar una pipeta de 0,5 mL.

SKU	Descriptor
269167	FIPRODRAG PIP.0.67M.CAN.1
269168	FIPRODRAG PIP.1.34M.CAN.1
269169	FIPRODRAG PIP.2.68M.CAN.1
152561	FIPRODRAG PIP.4.02ML. CAN1
152560	FIPRODRAG PIP.0.5ML.GAT.1

### Condición de venta: Venta directa

#### Modo de aplicación de la pipeta:



Retirar la punta superior metacida de la pipeta.



Poner la punta de la pipeta directamente sobre la piel del animal, al altura de las escápulas (hombros) o en la base del cuello, procurando separar el pelo.



Aprezar y vaciar totalmente el contenido de la pipeta en 2 o 3 puntos como se indica en la figura.

#### Consideraciones extras:

Evitar el contacto con el animal tratado hasta que su pelaje se encuentre completamente seco y evitar dormir con el animal tratado recientemente.



## Frontline® Pipeta



- **Composición:** Fipronil 10%, (S)-metopreno 9% en solución tópica.
- **Indicaciones de Uso:** control y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*), tratamiento y control de garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) y piojos (*Trichodectes canis* y *Felicola subrostratus*). Se puede utilizar en dermatitis alérgica por pulgas en perros y gatos.
- **Eficacia del tto.:** Elimina a la pulga adulta antes que oviposite y controla la reinfección. Su actividad persistente controla la reinfección al eliminar a pulgas (larvas, huevos y pupas) y piojos durante 2 meses y a garrapatas durante 1 mes en perros. En gatos controla reinfección de pulgas y piojos durante 5 semanas. Puede utilizarse en gestación y lactancia en ambas especies.
- **Contraindicaciones:** No se debe utilizar en cachorros y gatitos de menos de 8 semanas de edad o 1 kg de peso (en gatos). No usar en conejos.
- **Efectos adversos:** Rara vez pueden observarse reacciones transitorias en el sitio de aplicación (descamación, pérdida de pelo local, picazón, enrojecimiento) o de forma generalizada se puede observar picazón o pérdida de pelo.

### Presentaciones y SKU:

- Aplicar 1 pipeta de 0,67 mL por animal, en perros de 2 hasta 10 kg de peso corporal (Fipronil: 6,7 mg/kg; (S)-metopreno: 6,0 mg/kg).
- Aplicar 1 pipeta de 1,34 mL por animal, en perros de 10 hasta 20 kg de peso corporal (Fipronil: 6,7 mg/kg; (S)-metopreno: 6,0 mg/kg).
- Aplicar 1 pipeta de 2,68 mL por animal, en perros de 20 hasta 40 kg de peso corporal (Fipronil: 6,7 mg/kg; (S)-metopreno: 6,0 mg/kg).
- Aplicar 1 pipeta de 0,5 mL por gato (Fipronil: 5 mg/kg; (S)-metopreno: 6 mg/kg).


SKU	Descriptor
251747	FRONTLINE PLUS 0.67ML 1
251748	FRONTLINE PLUS 1.34ML 1
251749	FRONTLINE PLUS 2.68ML 1
251746	FRONTLINE PLUS GAT.0.5M.1

### Condición de venta: Venta directa

**Modo de aplicación de la pipeta:** Cortar la pipeta a nivel de la parte superior marcada, vaciar el contenido de esta directamente sobre la piel, separando el pelo, preferentemente en 2 puntos, en la base del cuello y entre las dos escapuldas, para evitar el lamido.

### Consideraciones extras:

- El producto tarda 24 horas en extenderse por el pelo del animal. No se recomienda bañar al animal durante las 48 horas anteriores y posteriores a su aplicación.
- Si hay alto riesgo de reinfección con pulgas se recomienda aplicación mensual y en áreas de bajo riesgo se puede administrar cada 6 semanas.
- En perros Frontline® Plus no evita por completo la adhesión de las garrapatas al animal, pero éstas mueren durante las primeras 24-48 horas posterior a su adhesión. Una vez muertas, las garrapatas suelen desprenderse del animal, aunque en caso contrario pueden eliminarse fácilmente tirando de ellas con suavidad.



**Bravecto® transd. Pipeta**

- **Composición:** Fluralaner solución tópica.
- **Indicaciones de Uso:** Para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) en gatos durante 12 semanas. Las pulgas se deben fijar al huésped y comenzar a alimentarse con el fin de estar expuesto al principio activo.
- **Eficacia del tto.:** El inicio del efecto ocurre dentro de las 12 horas de la fijación de las pulgas (*C. felis*). Para el tratamiento de infestaciones por ácaros del oído (*Otodectes cynotis*) en gatos durante 12 semanas. Se puede utilizar para la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP).
- **Contraindicaciones:** No administrar en gatas preñadas o en lactancia, ni en gatos reproductores. No se debe utilizar en gatitos menores de 11 semanas de edad y/o en gatos que pesen menos de 1,2 kg.
- **Efectos adversos:** En casos aislados de reacciones cutáneas leves y transitorias en el sitio de aplicación, como eritema y prurito o alopecia.


**Presentaciones y SKU:**

- Pipeta de 0,40 mL (112,5 mg de Fluralaner) para gatos de >1,2 a 2,8 kg.
- Pipeta de 0,89 mL (250 mg de Fluralaner) para gatos de >2,8 a 6,25 kg.
- Pipeta de 1,79 mL (500 mg de Fluralaner) para gatos de >6,25- 12,5 kg.

SKU	Descriptor
542074	BRAVECTO PIP.GATO 250MG
542039	BRAVECTO PIP.GATO 112,5MG 0,40ML
542076	BRAVECTO PIP.GATO 500MG

**Condición de venta: Venta Receta Simple**

**Modo de aplicación de la pipeta:** Apriete suavemente la pipeta con el objeto de aplicar todo el contenido directamente en la piel. El producto debe aplicarse en un solo punto en la base del cráneo en gatos de hasta 6,25 kg de peso corporal y en dos puntos en gatos que pesen más de 6,25 kg de peso corporal.

**Consideraciones extras:**

- Evitar el baño frecuente y/o uso de shampoo en el animal porque la mantención de la efectividad del producto en estos casos no ha sido evaluada.
- No sumergir, ni bañar a los gatos con shampoo, antes, durante o posterior a la aplicación del tratamiento.
- El producto no se debe administrar en intervalos más cortos a 8 semanas debido a que no se ha estudiado la seguridad para intervalos más cortos.

- **Comprimidos masticables**

Venta Receta simple /Especies:



**Bravecto® Comp. Mast.**



- **Composición:** Fluralaner (micronizado) comprimido masticable.
- **Indicaciones de Uso:** Para el tratamiento y control de infestaciones por garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* adultas y juveniles) y pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) en perros. Tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP).
- **Eficacia del tto.:** Tiene actividad sistémica durante 12 semanas. Las pulgas y garrapatas se deben fijar al huésped y comenzar a alimentarse con el fin de estar expuesta al principio activo. El inicio del efecto ocurre dentro de las 8 horas de la fijación de las pulgas (*C. felis*) y 12 horas de la fijación de las garrapatas. Se puede utilizar durante la preñez, lactancia y en animales reproductores.
- **Contraindicaciones:** No se debe utilizar en cachorros menores de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg.
- **Efectos adversos:** Casos aislados de síntomas gastrointestinales leves y transitorios tales como diarrea/ vómito/ inapetencia/ babeo, relacionados con la vía de administración del producto se observaron en estudios clínicos.

**Presentaciones y SKU:**

- Comprimidos masticables (Fluralaner 112,5 mg) para perros >2-4,5 kg.
- Comprimidos masticables (Fluralaner 250 mg) para perros >4,5-10 kg.
- Comprimidos masticables (Fluralaner 500 mg) para perros >10-20 kg.
- Comprimidos masticables (Fluralaner 1000 mg) para perros >20-40 kg.
- Comprimidos masticables (Fluralaner 1400 mg) para perros >40-56 kg.

SKU	Descriptor
542162	BRAVECTO COM.MAST.112MG.1
542163	BRAVECTO COM.MAST.250MG.1
542164	BRAVECTO COM.MAST.500MG.1
542165	BRAVECTO COM. MAST.1000MG.1
542166	BRAVECTO COM. MAST.1400MG.1

Dosis: Los comprimidos masticables se deben administrar de acuerdo con la siguiente tabla (correspondiente a una dosis de 25-56 mg de fluralaner/kg de peso corporal dentro de un rango de peso)

**Condición de venta: Venta receta simple**

**Consideraciones extras:**

- Se puede utilizar para el tratamiento de la **sarna demodélica generalizada de presentación adulta o juvenil** causada por *Demodex spp.*
- Se puede utilizar para el tratamiento de **sarna sarcóptica** causada por *Sarcoptes scabiei* e infestaciones por *Otodectes cynotis*.
- Los parásitos deben iniciar la alimentación en el huésped para estar expuestos al principio activo Fluralaner, por lo que en caso de que las condiciones sean desfavorables no se debe excluir el riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias.
- El producto no se debe administrar en intervalos más cortos a 8 semanas debido a que no se ha estudiado la seguridad para intervalos más cortos.



Venta Receta simple/Especies: 

**Simparica® Comp. Mast.**



- **Composición:** Sarolaner 20 mg en comprimido masticable.
- **Indicaciones de Uso:** Está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*), garrapata (*Rhipicephalus sanguineus*). También está indicado para el tratamiento de la sarna causada por Sarcoptes scabiei y *Demodex canis* y para el tratamiento de *Otodectes cynotis* (ácaro de la oreja).
- **Eficacia del tto.:** La duración del efecto es hasta 5 semanas. Para el tratamiento de sarna sarcóptica se debe administrar una vez al mes por dos meses consecutivos.
- **Contraindicaciones:** No administrar a perros y cachorros menores a 8 semanas de edad y 1,3 Kg de peso corporal. No usar en gatos. No administrar en hembras preñadas o en lactancia, ni animales reproductores.
- **Efectos adversos:** No se han atribuido reacciones adversas serias a la administración de Simparica® en la dosificación recomendada de 2 mg/kg de peso corporal.

**Presentaciones y SKU:**

Dosis: 2 mg de Sarolaner/Kg de peso vivo, en dosis única.

- Simparica® 5 mg 1 comprimido para perros de 1,3 a 2,5 Kg de peso.
- Simparica® 10 mg 1 comprimido para perros de 2,5 a 5,0 Kg de peso.
- Simparica® 20 mg 1 comprimido para perros de 5,0 a 10,0 Kg de peso.
- Simparica® 40 mg 1 comprimido para perros de 10,0 a 20,0 Kg de peso.
- Simparica® 80 mg 1 comprimido para perros de 20,0 a 40,0 Kg de peso.
- Simparica® 120 mg 1 comprimido para perros de 40,0 a 60,0 Kg de peso.

**Condición de venta: Venta receta simple**

SKU	Descriptor
541978	SIMPARICA COM.MAST.5MG.3 COMP.
541971	SIMPARICA COM.MAST.5MG.1 COMP.
542171	SIMPARICA COM.MAST.10MG.3 COMP.
542176	SIMPARICA COM.MAST.10MG.1 COMP.
542172	SIMPARICA COM.MAST.20MG.3 COMP.
542178	SIMPARICA COM.MAST.20MG.1 COMP.
541981	SIMPARICA COM.MAST.40MG.3 COMP.
542179	SIMPARICA COM.MAST.40MG.1 COMP.
542174	SIMPARICA COM.MAST.80MG.3 COMP.
542180	SIMPARICA COM.MAST.80MG.1 COMP.
542175	SIMPARICA COMMAST.120MG.3 COMP.
542181	SIMPARICA COMMAST.120MG.1 COMP.

**Consideraciones Extras:**

- No administrar sin indicación médica con tratamientos antiinflamatorios (AINES) o Warfarina.
- Se puede utilizar como complemento en el tratamiento contra demodicosis (ácaro *Demodex spp.*) la administración mensual durante dos meses consecutivos es eficaz y conduce a una mejora sustancial de los signos clínicos. El tratamiento debe continuarse hasta que se obtengan dos raspados negativos de la piel, con un mes de diferencia. Los casos severos pueden requerir tratamientos mensuales prolongados.

**Credelio® Comp. Mast.**

- **Composición:** Lotilaner comprimido masticable.
- **Indicaciones de Uso:** está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*), garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) y tratamiento de la demodicosis (*Demodex spp.*) en perros. Puede ser usado como parte del tratamiento estratégico en el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP).
- **Eficacia del tto.:** Provee un efecto pulguicida y garrapaticida durante un mes. Las pulgas y garrapatas preexistentes son eliminadas luego de 6 y 4 horas de administrado el producto respectivamente y las nuevas infestaciones de pulgas son eliminadas en 4 horas. Se debe administrar con alimentos.
- **Contraindicaciones:** No utilizar en perros con menos de 8 semanas y/o que pesen menos de 1,3 kg. No utilizar durante preñez, lactancia ni en animales reproductores.
- **Efectos adversos:** En casos muy raros, pueden producirse reacciones adversas asociadas a efectos gastrointestinales leves y transitorios, como vómitos y diarrea. Estos signos suelen resolverse sin tratamiento.

**Presentaciones y SKU:**

Dosis de principio activo: administrar una dosis de 20 a 43 mg de lotilaner/kg de peso corporal.

SKU	Descriptor
532110	CREDELIO COMAST.56,25MG.3 COMP.
532115	CREDELIO COMAST.112,5MG.3 COMP.
532111	CREDELIO COMAST.225MG.3 COMP.
532112	CREDELIO COMAST.450MG.3 COMP.
532113	CREDELIO COMAST.900MG.3 COMP.

**Condición de venta: Venta receta simple****Consideraciones extras:**

- Se puede utilizar como complemento en el tratamiento contra demodicosis (ácaro *Demodex spp.*) la administración mensual durante dos meses consecutivos es eficaz y conduce a una mejora sustancial de los signos clínicos. El tratamiento debe continuarse hasta que se obtengan dos raspados negativos de la piel, con un mes de diferencia. Los casos severos pueden requerir tratamientos mensuales prolongados.



**Nexgard® Comp. Mast.**

- **Composición:** Afoxolaner comprimido masticable.
- **Indicaciones de Uso:** Está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y tratamiento y control de garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*).
- **Eficacia del tto.:** Debe ser administrado una vez por mes. Mata pulgas antes de que coloquen los huevos. Tiene un rápido comienzo de acción contra pulgas. Su efecto se inicia 30 minutos después de la administración y alcanza 100% de eficacia en 8 horas; controla reinfestación de pulgas adultas y garrapatas por un mes. También está indicado en el tratamiento de la demodicosis (*Demodex canis*) y sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*).
- **Contraindicaciones:** No usar en Cachorros con menos de 8 semanas de edad. No usar en hembras durante la etapa de gestación y lactancia.
- **Efectos adversos:** reacciones gastrointestinales leves (vómitos, diarreas), prurito, letargia o anorexia y signos neurológicos (convulsiones, ataxia y temblores musculares) han sido reportados en muy raras ocasiones.

**Presentaciones y SKU:**

- NexGard® 11,3mg comprimidos en perros de 2 a 4kg.
- NexGard® 28,3mg comprimidos en perros de 4,1 a 10kg.
- NexGard® 68mg comprimidos en perros de 10,1 a 25kg.
- NexGard® 136mg comprimidos en perros de 25,1 a 50kg.
- Por encima de 50 kg Administre la combinación adecuada de antiparasitarios masticables.

La dosis recomendada es de 2,5 mg/kg una vez al mes, equivalente a 1 comprimido del tamaño adecuado de acuerdo con el peso del perro.

SKU	Descriptor
386512	NEXGARD COM.MAST.11,3MG.3 COMP.
386503	NEXGARD COM.MAST.11,3MG.1 COMP.
386513	NEXGARD COM.MAST.28,3MG.3 COMP.
386508	NEXGARD COM.MAST.28,3MG.1 COMP.
386514	NEXGARD COM.MAST.68MG.3 COMP.
386509	NEXGARD COM.MAST.68MG.1 COMP.
386515	NEXGARD COM.MAST.136MG.3 COMP.
386510	NEXGARD COM.MAST.136MG.1 COMP.

**Condición de venta: Venta receta simple****Consideraciones extras:**

- Se puede utilizar como complemento en el tratamiento de la demodicosis (ácaro *Demodex spp.*), Administración mensual del producto hasta que se obtengan dos raspados de piel negativos realizados con un mes de diferencia. Los casos graves pueden requerir tratamientos mensuales prolongados.
- Los parásitos necesitan comenzar a alimentarse una vez adheridos al huésped para quedar expuestos al Afoxolaner, por lo tanto, no puede descartarse el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por parásitos.



- **Shampoo**

**Venta Directa /Especies:** 

### Dorazel® Plus Shampoo



- **Composición:** Permetrina 1% y Piperonil butóxido 2,5% csp.300mL en Shampoo.
- **Indicaciones de Uso:** Efectivo para eliminar pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*), garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) y piojos (*Trichodectes canis*) en perros.
- **Eficacia del tto.:** El tratamiento se debe repetir cada una semana. Modo de uso: Agite el envase antes de usar, luego moje al animal con abundante agua, y aplique 2 mL de shampoo/Kg de peso directamente sobre la piel y pelaje, desde la cabeza a la cola. Friccione, hasta lograr abundante espuma y deje actuar por 10 a 15 minutos, luego enjuague con abundante agua.
- **Contraindicaciones:** No usar en gatos. No usar en cachorros menores de 12 semanas de edad. No usar en hembras en gestación o lactancia.
- **Efectos adversos:** Los piretroides rara vez presentan signos de toxicidad, debido a su alta selectividad sobre insectos y artrópodos y a su baja absorción sistémica en mamíferos. En algunas ocasiones podría ocurrir prurito o leve irritación, de carácter transitorio.

#### Presentaciones y SKU:

2 mL de shampoo/Kg de peso (equivalentes a 20 mg de Permetrina y 50 de Piperonil Butéxido/Kg de peso)

**Condición de venta:** Venta directa.

SKU	Descriptor
152084	DORAZEL PLUS SH.PERRO 300

#### Modo de uso:

- Agite el envase antes de usar, luego moje al animal con abundante agua, y aplique 2 mL de shampoo/Kg de peso (equivalentes a 20 mg de Permetrina y 50 de Piperonil Butéxido/Kg de peso) directamente sobre la piel y pelaje, desde la cabeza a la cola. Friccione, hasta lograr abundante espuma y deje actuar por 10 a 15 minutos, luego enjuague con abundante agua. Repetir el tratamiento semanalmente en caso necesario.



## • Spray y Soluciones

### Fiprokill® Spray



**Venta Directa /Especies:**  

- **Composición:** Fipronil 0,25% spray.
- **Indicaciones de Uso:** es efectivo en el control y tratamiento de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros y gatos.
- **Eficacia del tto.:** En perros, proporciona un período de protección de 3 meses contra pulgas y de 5 semanas contra garrapatas. En gatos, el período de protección contra pulgas es de 4 semanas. Aplicar entre 6 a 12 atomizaciones de Fiprokill® por Kg de peso. La eliminación de garrapatas se inicia 24 a 48 horas después de la aplicación. Es seguro en cachorros y gatitos desde los 2 días de edad, siempre que la aplicación se efectúe según las recomendaciones. Puede usarse en gestación y lactancia.
- **Contraindicaciones:** No aplicar en conejos.
- **Efectos adversos:** Si el animal se lamiese puede existir un breve período de hipersalivación (principalmente en gatos). Podrían ocurrir reacciones cutáneas transitorias en el sitio de aplicación como eritema, prurito o alopecia. En caso de hipersensibilidad o irritación local se recomienda no repetir el tratamiento.

### Presentaciones y SKU:

Dosis del principio activo: 7,5 -15 mg de Fipronil / Kg de peso vivo.

SKU	Descriptor
152543	FIPROKILL SP.PER/GAT 50ML
256496	FIPROKILL SP.CAN/GAT 100M

### Condición de venta: Venta directa.

#### Modo de uso:

- Aplicar el producto en ambientes ventilados y asegúrese de ocupar guantes. Aplicar siempre a contra pelo, a una distancia de aproximadamente 20 cm. Las zonas sobre las cuales se debe aplicar el producto son el vientre y los flancos (pecho, abdomen, axilas, hombros y patas).
- En animales de pelo largo, apartar el pelo y aplicar en la raíz. Friccionar el pelo para que el producto penetre la piel. Luego de administrado el producto, no exponer al animal a fuentes de calor, dejar secar naturalmente.
- Para tratar la cara, verter un poco del producto en la palma de la mano enguantada y luego aplicar frotando suavemente la cara evitando los ojos, boca y mucosas.

#### Consideraciones extras:

- Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas.
- Se recomienda no bañar al animal dentro de las 48 horas antes y después de la aplicación del producto.



**Frontline® Spray**

- **Composición:** Fipronil 0,25% spray.
- **Indicaciones de Uso:** Controla reinfecciones por pulgas adultas (*Ctenocephalides felis*) recientemente adquiridas y antes que pongan huevos, por uno a tres meses en perros y, por un mes a seis semanas en gatos. También, garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) por 5 semanas en perros. Finalmente, también actúa contra piojos masticadores (*Trichodectes canis* en perros y *Felicola subrostratus* en gatos).
- **Eficacia del tto.:** Puede ser utilizado en gestación y lactancia. Es seguro en cachorros y gatitos desde los 2 días de edad, siempre que la aplicación se efectúe según las recomendaciones. el intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas.
- **Contraindicaciones:** No aplicar en conejos.
- **Efectos adversos:** Si el animal lame el producto, suele ocurrir un corto periodo de hipersalivación debido a la naturaleza del vehículo. Entre las raras sospechas de reacción adversa al producto, fueron relatados casos transitorios de eritema, prurito o alopecia.

**Presentaciones y SKU:**

SKU	Descriptor
152077	FRONTLINE SP.PE/GA.250ML.
152078	FRONTLINE SP.100ML.

**Condición de venta:** Venta directa.**Modo de uso:**

- Aplicar sobre el pelo del animal desde una distancia de aproximadamente 10-20 cm, según la posología indicada abajo. En animales de pelo largo, apartar y aplicar el producto a contra pelo, hasta la raíz. Friccionar el pelo para que el producto penetre hasta la piel. Dejar secar naturalmente. No secar con una toalla.
- Dosis: Pulverizar de 3-6 mL por kg p.v. (7,5 - 15 mg de Fipronil por kg), o sea, 2 – 4 pulverizaciones por kg para el frasco pulverizador de 250 y 500 mL, y de 6 -12 pulverizaciones para el frasco pulverizador de 100 mL, lo que provee la dosis mínima recomendada de 7,5 mg de Fipronil/kg p.v. en perros y gatos.

**Consideraciones extras:**

- Periodo de eficacia (estabilidad) desde que se abre el envase: 36 meses.
- Se recomienda no bañar al animal dentro de las 48 horas antes y después de la aplicación del producto.



**Sinpulspray®**

- **Composición:** Permetrina 0,2%, Piperonil Butoxido 2% en solución Spray.
- **Indicaciones de Uso:** Elimina pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros.
- **Eficacia del tto.:** Si el perro tiene una gran cantidad de pulgas y/o garrapatas, se recomienda repetir la aplicación cada 7 a 15 días.
- **Contraindicaciones:** No usar en gatos. No usar en cachorros menores a 6 semanas de edad. No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
- **Efectos adversos:** En algunos casos podría ocurrir prurito o leve irritación en el sitio de aplicación.

**Presentaciones y SKU:**

Dosis: 6 a 18 mg/kg de Permetrina y 60 a 180 mg/kg de Piperonil butéxido.

SKU	Descriptor
152201	SINPUL (ULTILEP) SP.200ML

Para la presentación de 200 mL, que posee una válvula que permite dosificar 200 uL por atomización, se debe aplicar 15 a 45 atomizaciones por kilo, dependiendo del largo del pelaje.

**Condición de venta: Venta directa.****Modo de uso:**

- Rociar el producto en todo el cuerpo del perro, desde la cola al cuello (aplicación a contrapelo). Luego de aplicar, frotar vigorosamente con las manos todo el cuerpo para que el producto logre el máximo contacto con la piel y no sólo quede en el pelaje.
- Para la presentación de 200 mL, que posee una válvula que permite dosificar 200 uL por atomización, se debe aplicar 15 a 45 atomizaciones por kilo, dependiendo del largo del pelaje.

**Consideraciones extras:**

- Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese periodo de tiempo.

sim@cruzverde.cl  
226944028 opción 4  
\*7700 opción 4